arud

Zentrum für Suchtmedizin

Motivierende Ansätze in der Behandlung von Patient:innen mit Substanzgebrauchsstörungen

Thilo Beck

Chefarzt Psychiatrie

Zürich, 20.03.2025

Arud – umfassende Suchtmedizin unter einem Dach

Agenda

- Einführung
- Paternalistische Tendenzen im Gesundheitswesen und der laufende Paradigmenwechsel in der Medizin im allgemeinen und der Suchttherapie im speziellen
- Die notwendige Haltung und entsprechende Skills und Methoden zur produktiven Zusammenarbeit mit unseren Patient:innen
- Zusammenfassung

«It's not about the person failing the treatment, but about the treatment failing the person»

Karen Ward, board member of the Vancouver Area Network of Drug Users

arud

Pragmatische, bedarfsorientierte Therapiekonzepte auf einer vertrauensbasierten Arbeitsgrundlage

Suchtpotential psychotroper Substanzen

Anthony 2002, Florez-Salamanca 2013

Alkohol: Die Menge macht den Schaden

Trinkmengenreduktion korreliert mit

Verbesserung

- Lebensqualität
- Psychische Gesundheit
- Blutdruck
- Leberfunktion

Tieferen Gesundheitskosten

Alkoholabhängigkeit im Zeitverlauf

Zieloffenes Arbeiten

→ Abstinenz als möglicher Zustand
Nicht als Ziel per se

Kontinuum der Konsumformen

moderat-abstinent

- Keine schweren Beeinträchtigungen in der Lebensführung (Werte und Ziele)
- Genügende Selbstkontrolle
- Gesundheit berücksichtigt

Treatment Gap

- 80% der Personen mit Substanzstörung sind bei einem Grundversorger, viele undiagnostiziert
- 40-60% wünschen keine Abstinenz
- 10-20% sind in einer Behandlung für das Substanzproblem

Diagnostik in der Grundversorgung

Klassische Rollen im Gesundheitswesen

- Expertenstatus der Professionellen
- Paternalistisches Grundverständnis

Chronic Care Model 2.0: Minimally Disruptive Medicine (MDM)

- Empowerment des Patienten
- Förderung des Self Managements
- Vermittlung von Information
- Gemeinsame Problemdefinition
- Aktiviere intrinsische Motivation
- Kollaborativer Arbeitsstil

Developed by The MacColl Institute
© ACP-ASIM Journals and Books

Paradigmenwechsel in der Medizin

«Vom technischen Experten zum Patienten-Experten»

«Von der Compliance zur Adherence»

- Zuhören
- Verstehen
- Informationsvermittlung, Klärung, Aktivierung, Unterstützung
- Gemeinsame Planung

Der Zugang zur Patient:in

- Förderung der Autonomie und des Selbstwerterlebens
- Zieloffenheit: Partnerschaftliches Erarbeiten von Zielen gemäss individuellen Bedürfnissen und Einschränkungen
- Förderung werteorientierten Handelns

Motivierende Gesprächsführung

Solides Arbeitsverhältnis

- Zuhören, Wertschätzen, Anerkennen (Interesse, Respekt und Empathie)
- Verstehe Bedürfnisse
- Aktiviere Werte
- Unterstütze kognitive Dissonanz
- Information and Empowerment
- Bearbeiten von Ambivalenz
- Menu of options (Alternativen entwickeln)
- Fördere Selbstvertrauen
- Respektiere Autonomie des Gegenübers
- Unterstütze Zielerreichung

arud

PROZESSE

Beziehungsaufbau

Fokussierung

Evokation

Planung

PRINZIPIEN DER INTERVENTION

Akzeptanz

Entwicklung
von
Diskrepanzen

Stärkung der
Änderungs-
zuversicht

Umgang mit
sustain talk und
Dissonanz

METHODEN

Offene Fragen

Reflektierendes
Zuhören

Würdigung

Förderung
change talk

Informieren
Ratschläge geben

Zusammen-
fassungen

Förderung con-
fidence talk

Beziehungsaufbau

- Von Vertrauen und Respekt geprägte Arbeitsbeziehung
- Verständigung über Behandlungsziele
- Kooperation bei miteinander vereinbarten Aufgaben zur Erreichung dieser Ziele

Stolpersteine

- Diagnose-Falle
- Experten-Falle
- Vorschnelle Fokussierung
- Etikettierung (Zuschreibung)
- Schuldzuweisung
- Small-Talk

Fallvignette Kokain: Funktion des Konsums

- 35jähriger Banker
- Seit Alter 20 gelegentlicher Kokainkonsum
- Seit 5 Jahren zunehmend regelmässig (Binge Type) verbunden mit Alkohol und Online Pornographie
- Zunehmend Probleme im privaten und beruflichen Umfeld, finanzielle Schwierigkeiten
- Möchte so nicht mehr weitermachen
- Schafft es einfach nicht

Fallvignette Kokain: Funktion des Konsums

- Würdigung und Betrachtung der Gesamtsituation
- Komorbide ADHS diagnostiziert
- Konsum als Coping-Strategie betrachtet
- Unter Stimulantientherapie deutliche Verbesserung
- Zusätzlich Disulfiram

Phasen der Veränderungsbereitschaft

Ermögliche Rückkehr zum Konsumziel (Rückfallmanagement)

Halte Kontakt (Nachsorge, inkl. Rückfallprävention)

Gib neue Informationen

Erkunde das Pro und Kontra

Kläre und Festige Ziel und Weg

Setze evidenzbasierte Interventionen ein

Kommunikationsstrategie

- O** Open ended questions (Offene Fragen)
- A** Affirmation (Anerkennung, Würdigung)
- R** Reflection (aktives Zuhören)
- S** Summary (Zusammenfassungen)

Aktives Zuhören

- Aktives Zuhören führt dazu, dass der andere sich verstanden und ernstgenommen fühlt und seine Gedanken und Annahmen nochmals durchgehen und überprüfen kann.
- Aktives Zuhören erleichtert das Problemlösen. Das Aussprechen auch von unangenehmen Dingen, das "laute Denken", wird gefördert.
- Aktives Zuhören läßt die Verantwortung für das Lösen des Problems beim anderen.

Fallvignette Alkohol: Wo liegt der Fokus?

- 50jähriger Banker
- Verheiratet, zwei adoleszente Kinder
- Stress und Druck am Arbeitsplatz seit 10 Jahren
- Schlafstörungen
- Depressive Verstimmungszustände/Burn out
- 2 stationäre Behandlungen in Vorgeschichte

- Laufende psychiatrisch/psychotherapeutische Behandlung
- Medikamentös eingestellt mit Venlafaxin, Lithium, Quetiapin und Propranolol
- Kopfschmerzen
- Zunehmender Alkoholkonsum abends und über's Wochenende
- Zunehmende Sorge der Ehefrau

Fallvignette Alkohol

- Standortbestimmung, Problemdefinition
 - Gespräche zusammen mit der Ehefrau
 - Therapeutisch Fokus Stressbewältigung, Selbstfürsorge
 - Abbau Medikation
 - Alkohol Ziel Konsumreduktion
-
- Nalmefene 18mg
 - Ambulante Alkoholentzüge
 - Regelmässiges körperliches Training
 - Bupropion

Screening und Brief Intervention

- Assessment (Screening)
- Feedback
 - Problembewusstsein
 - Handlungsmotivation
- Bedarfsgerechte Intervention
- Anwendung von Methoden des MI (Motivational Interviewing)
- Überweisung komplexer Fälle

AUDIT, AUDIT-C

AUDIT (max. 40 Punkte)

Cut-off Werte

≥ 4 bei Frauen

≥ 5 bei Männern

≥ 8 (WHO)

AUDIT C (max. 12 Punkte)

Cut-off Werte

≥ 3 bei Frauen

≥ 4 bei Männern

Domains	Question Number	Item Content
Hazardous Alcohol Use	1	Frequency of drinking
	2	Typical quantity
	3	Frequency of binge drinking
Dependence Symptoms	4	Impaired control over drinking
	5	Increased salience of drinking
	6	Morning drinking
Harmful Alcohol Use	7	Guilt after drinking
	8	Blackouts
	9	Alcohol-related injuries
	10	Others concerned about drinking

Ein Glas Alkohol entspricht etwa:

0,33 Liter Bier

0,15 Liter Wein oder Sekt

0,02 Liter Spirituosen

Adäquate Intervention entsprechend AUDIT Score

Informationsvermittlung

- Auf Einladung
- Feedback zum Screening-Resultat
- Problembewusstsein aktivieren
- Weitere Schritte planen

Screening und Kurzintervention mit Assist

- 7 Fragen
 - Alle psychoaktiven Substanzen
1. Lebenszeit-Konsum
 2. Konsum letzte 3 Monate
 3. Craving
 4. Probleme
 5. Funktionsbeeinträchtigung
 6. Kommentare aus dem Umfeld
 7. Erfolglose Reduktionsversuche
(Zusatzfrage i.v.-Konsum)
- ➔ Keine Intervention 0-3
Kurzintervention 4-26
Intensive Behandlung 27+

ASSIST

(Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)

Name der Ärztin/des Arztes	<input type="text"/>	Klinik	<input type="text"/>
Name Patient*in	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>

Anleitung

Viele Drogen und Medikamente können Ihre Gesundheit beeinträchtigen. Ihr Arzt (oder andere Personen aus der Gesundheitsversorgung) braucht genaue Informationen darüber, welche Substanzen Sie im Einzelnen konsumieren, um die bestmögliche Behandlung gewährleisten zu können. Mit den folgenden Fragen soll Ihr Konsum von Alkohol, Tabak und anderen Drogen erfasst werden. Diese Substanzen können geraucht, geschluckt, gesniff, inhaliert, injiziert oder in Form von Tabletten genommen werden (an dieser Stelle die Substanzliste präsentieren).

Einige der hier aufgeführten Substanzen können von einem Arzt verschrieben werden (wie z.B. Amphetamine, Beruhigungsmittel oder Schmerzmittel). In diesem Interview sollen Substanzen, die so eingenommen wurden, wie sie vom Arzt verschrieben wurden, nicht erfasst werden. Wenn Sie jedoch diese Medikamente häufiger, in einer höheren Dosierung oder aus anderen Gründen genommen haben als den vom Arzt verschriebenen, dann teilen Sie mir dies bitte mit. Da ich auch nach Ihrem etwaigen Gebrauch verschiedener illegaler Substanzen fragen werde, möchte ich Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt werden.

Vor Beginn: Zunächst Antwortkarte dem Patienten geben!

arud

Gestaltung der Interaktion (Abklärung und Behandlung)

Beziehungsaufbau und Zusammenarbeit

- Von Vertrauen und Respekt geprägte Arbeitsbeziehung
- Herausarbeiten von Werten, Üben einer achtsamen, zentrierten, akzeptierenden Haltung
- Verständigung über entsprechende Behandlungsziele
- Kooperation bei miteinander vereinbarten Aufgaben zur Erreichung dieser Ziele

Veränderungsbereitschaft fördern, Motivation aufbauen: Change Talk

Kategorien Selbstmotivierender Aussagen

- Problembewusstsein
- Besorgnis
- Veränderungsabsicht
- Zuversicht

Sustain Talk

- Gehört in (fast) jeden Entscheidungsprozess
- Pro- und Kontra-Diskussion des inneren Komitees

„Tanzen und Ringen“

Fallvignette Cannabis: Zuversicht stärken

- 28jährige Werbefachfrau
- Regelmässiger Cannabiskonsum seit Adoleszenz
- Raucht Cannabis mit Tabak v.a. abends zum Entspannen und zum Schlafen
- Hat zunehmend Mühe, Cannabiskonsum mit Lebensentwurf zu vereinbaren

Fallvignette Cannabis : Zuversicht stärken

- Cannabis-Abbau mit Konsumtagebuch
- Einhergehend mit kombinierter Tabakentwöhnungstherapie (Cytisin plus NRT)
 - Alternative Möglichkeit: Umsteigen auf E-Zigarette

Veränderungsbereitschaft fördern: Motivation aufbauen

Change talk hervorrufen

- Extreme benutzen (grösste Sorge)
- Zurückschauen (wie war es vorher?)
- Nach vorn Blicken (bessere Zukunft beschreiben)
- Ziele herausfinden (Wertvorstellungen)
- Ausführliche Darstellung (Vertiefung, Detaillierung)

Auf Change Talk reagieren

- Change Talk vorschiessen
- Change Talk den Klauen der Ambivalenz entreissen

«Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bin ich schon müde. Ich bereite das Abendessen vor und helfe den Kindern bei den Hausaufgaben, und wenn ich sie in's Bett gebracht habe, bin ich erschöpft. Ich weiss, ich sollte mich mehr bewegen, aber ich weiss einfach nicht, woher ich die Zeit dafür nehmen soll»

Fallvignette Benzodiazepine: Quo vadis?

- 65jährige Hausfrau
- 20 Jahre Bromazepam (Lexotanil®) vom HA verschrieben
- Vermag nicht mehr abzusetzen
- Mehrere erfolglose stationäre Entzugsversuche
- Weiss nicht, wie es weitergehen soll

Fallvignette Benzodiazepine: Quo vadis?

- Prüfung der Optionen Substitution versus Abbau
- Langsames Tapering gemäss klinischem Bild
- Einbezug des Ehemanns
- Gabapentin und Antidepressiva zur Unterstützung

Auf Sustain Talk reagieren

- Direkte Reflexion: Einfache/komplexe Wiedergabe
- Erweiternde Reflexion: Akzentuierung
- Zweiseitige Reflexion: ST UND CT
- Betonung der persönlichen Autonomie: Alleine Ihre Entscheidung
- Reframing: Neuinterpretation
- Zustimmungende Wendung: Vorbereitung Reframing
- Schwung holen: ST würdigen, dann Frage
- Sich auf die Seite stellen: Verschreibung Status Quo

Veränderungsbereitschaft fördern: Dissonanz erkennen

- **Argumentieren**
(Herausfordern, Misstrauen, Feindseligkeit)
- **Unterbrechen**
(Ins Wort fallen, Abbrechen)
- **Ablehnen**
(Anklagen, Widersprechen, Entschuldigen,
Bagatellisieren, Herunterspielen, Pessimismus,
Ablehnung, Widerwillen gegenüber Veränderung)
- **Ignorieren**
(Unaufmerksamkeit, Nichtantwort, Keine Reaktion,
Ablenken)

Auf Dissonanz reagieren

- Reflexion
- Um Entschuldigung bitten
- Würdigung
- Vershobener Fokus

Neutralität

- MI beschleunigt in der Regel Bewegung auf ein bestimmtes Veränderungsziel
- In bestimmten Situationen ist neutrale Haltung angezeigt (Equipoise)
- Deklaration der entsprechenden therapeutischen Haltung (Optionen gemeinsam prüfen)

Veränderungsbereitschaft fördern: Die Entscheidungswaage

Fortsetzung des bisherigen Trinkverhaltens	Veränderung des Trinkverhaltens
<p>Vorteile</p> <p>Der Alkohol hilft mir, mich zu entspannen.</p> <p>Es ist ein gutes Gefühl, betrunken zu sein.</p>	<p>Vorteile</p> <p>Ich führe eine glücklichere Ehe.</p> <p>Ich habe mehr Zeit für die Familie.</p> <p>Ich fühle mich besser.</p> <p>Ich habe weniger finanzielle Probleme.</p>
<p>Nachteile</p> <p>Es könnte mich meine Ehe kosten.</p> <p>Ich bin ein schlechtes Vorbild für meine Kinder.</p> <p>Ich ruiniere meine Gesundheit.</p> <p>Ich verschwende zuviel Zeit und Geld.</p>	<p>Nachteile</p> <p>Was soll ich meinen Freunden sagen?</p> <p>Ich werde keine Entspannung finden.</p>

Fallvignette Oxycodone: Möchte nicht aufhören

- 20jähriger Student
- Mit Alter 14 begonnen, mit verschiedenen Substanzen zu experimentieren
- Oxycodon als attraktivste Substanz erlebt
- zuerst nasal, dann i.v.
- Oft mit Midazolam kombiniert
- Beschaffung unsicher und teuer

Fallvignette Oxycodone : Möchte nicht aufhören

- Entscheid, Opioide weiterzuführen
- Komorbide ADHS und Spektrumsstörung diagnostiziert, Stimulantientherapie eingeleitet
- Umstellung auf OAT mit zugelassenem Agonisten
 - Zunächst erfolglos
 - Längere Phase mit Oxycodone
 - Dann Diaphin mit guter Akzeptanz
- Diaphin oral und nasal kombiniert
- Midazolam-Tapering mit Clonazepam-Abdeckung

Zusammenfassung

- Ohne solides, vertrauensvolles Arbeitsbündnis kann Adhärenz nicht gewährleistet/unterstützt werden.
- Eine Voraussetzung ist die Begegnung auf Augenhöhe, mit Respekt, Achtsamkeit, Empathie und Interesse.
- Der andere Pfeiler ist die Erarbeitung einer gemeinsamen Problemdefinition und daraus abgeleiteter Ziele, die für die Patient:in wichtig und relevant sind.
- Methoden der Motivierenden Gesprächsführung sind hilfreich, entsprechende Skills und die dazu notwendige Haltung zu entwickeln und zu üben.

Wichtigkeitsskala

Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie ihr Ziel / Vorhaben (bitte notieren Sie:)

erreichen können? Bitte tragen Sie ihre Einschätzung auf der untenstehenden Skala ein.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
gar nicht					extrem wichtig				
wichtig									

Zuversichtsskala

Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie ihr Ziel / Vorhaben (bitte notieren Sie:)

erreichen können? Bitte tragen Sie ihre Einschätzung auf der untenstehenden Skala ein.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
gar nicht zuversichtlich					sehr zuversichtlich				

Ihre Unterstützung im Praxisalltag

PEPra – Die Informationsplattform für Prävention im Praxisalltag
Alle wichtigen Informationen und Tools auf eine Klick:

www.PEPra.ch

Ihre Unterstützung im Praxisalltag

Motivational Interviewing auf
PEPra:

die Fortbildungsangebote auf
PEPra: